


Avertissements agricoles

DLP - 5-8-85544471



ISSN 0759-9616

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION DE LA QUALITÉ

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

B.P. 95 - 84140 MONTFAVET

Téléphone (90) 88.21.83

- ARBORICULTURE - CULTURES LÉGUMIÈRES - GRANDES CULTURES -

1er Août 1985 - N°15

ARBORICULTURE

TOUTES ESPÈCES

ACARIENS ROUGES - SURVEILLEZ LA POPULATION .

Abaissez celle-ci si nécessaire avant la mi-Août, date de dépôt des premiers oeufs hivernants et d'abaissement du seuil à 45 % de feuilles habitées .

COSSUS GÂTE-BOIS - RENOUVELEZ LA PROTECTION SI NÉCESSAIRE .

ARBRES FRUITIERS À PEPINS

CARPOCAPSE DES POMMES et DES POIRES - MAINTENIR LA PROTECTION ,

Sur les espèces et variétés devant être récoltées après le 8 Août, les captures demeurent en général faibles actuellement .

ZEUZÈRE - RENOUVELEZ LA PROTECTION , ATTAQUES PARFOIS IMPORTANTES .

En cas d'attaques observées et plus particulièrement en vergers jeunes et non encore productifs , On préférera alors le mévinphos .

OIDIUM - PROTEGEZ LES JEUNES POUSSES ,

dans les vergers irrigués ou ceux dont la végétation est encore active .

MINEUSE CERCLEE - ATTENDRE POUR INTERVENIR .

Actuellement, on se trouve entre deux vols . Le prochain traitement au méthomyl (LANNATE) ne se fera qu'après l'apparition de nouvelles mines, soit pas avant le 10 Août dans les régions les plus précoces .

EULIA - ATTAQUES TRÈS LOCALISÉES MAIS PARFOIS IMPORTANTES .

Sur pommes et poires en Vaucluse, notamment près des vignères, chenilles et dégâts voisins de ceux de la *Pandemis* .

En cas d'attaques en cours, les chenilles encore jeunes (moins d'un centimètre) sont sensibles aux pyrèthrinodides de synthèse .

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - PROTEGEZ LES VARIÉTÉS SENSIBLES DE COGNASSIERS ,

et observez les premières attaques éventuelles pour intervenir .

ARBRES FRUITIERS À NOYAU

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - TRAITEZ EN FONCTION DE LA DATE DE RÉCOLTE .

...../.....

CARPOCAPSE DES PRUNES - RENOUVELEZ LA PROTECTION ,

sur les variétés sensibles et tardives ou dès l'apparition des premiers points de gomme sur fruits .

MOUCHE DES FRUITS (Ceratitis capitata) - TRES PEU DE RISQUES .

Ne traitez donc que les vergers présentant des risques particuliers : fruits à noyau surtout à proximité de dépôts d'ordures ménagères et présentant des cas d'attaques identifiées et observées en 1984 ou actuellement .

On utilisera : diméthoate, fenthion, formothion, malathion ou trichlorfon (voir délai d'emploi avant récolte) .

MOUCHE DE L'OLIVE (Dacus oleae) - ENCORE INUTILE DE TRAITER .

Dans aucune région le vol n'a encore pratiquement débuté, bien que dans quelques endroits du Var (Trans-en-Provence et Cotignac) ainsi que dans les Bouches-du-Rhône (Sud des Alpilles) les premières captures aient eu lieu .

CULTURES LEGUMIERES

PLEIN CHAMP

MOUCHE DU CHOU - Vol nul .

MOUCHE DE LA CAROTTE - Vol nul .

TEIGNE DE LA POMME DE TERRE -

Vol faible . Il est inutile d'intervenir chimiquement .

Cependant, afin d'éviter que les chenilles puissent atteindre les tubercules, il est conseillé de maintenir une humidité suffisante du sol pour qu'il ne se fissure pas (irrigation par aspersion) .

On récoltera les parcelles à maturité le plus rapidement possible sans jamais laisser séjourner les pommes de terre sur la parcelle .

Les locaux de stockage doivent être nettoyés et fermés .

TEIGNE DU POIREAU -

Le vol se poursuit, renouvelez la protection .

SERRES et ABRIS

NOCTUELLE DE LA TOMATE -

Assurez la protection sur les tomates ayant au moins un bouquet fleuri .

Dans les exploitations menées en lutte biologique, utilisez le bacillus thuringiensis (Bactospéine P.M. 16000 à 1 kg de produit commercial/ha) .

Le traitement sera renouvelé tous les 8 jours pendant la période de risque .

La fermeture des ouvrants avant la tombée de la nuit permet aussi de limiter très fortement l'arrivée des papillons et donc des dégâts possibles .